



**2º EXAMEN
CATEGORÍA
PROFESIONAL DE
AUXILIAR DE
ENFERMERÍA**

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE nº 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería

ESPACIO PARA LA ETIQUETA ADHESIVA
CON EL CÓDIGO DE BARRAS



SUPUESTO PRACTICO 1

Sra. Felisa Andrada de 84 años residía sola en su vivienda particular y no tenía red de apoyo social. Se fracturó la cadera derecha, estando hospitalizada durante 10 días. En el hospital el equipo multidisciplinar le pasa la escala de valoración OARS, Escala Lawton y Brody y el cuestionario de Baber.

Siendo ingresada al alta en un Centro Socio-Sanitario. Se ha realizado una Valoración Geriátrica Integral obteniéndose las siguientes puntuaciones.

Escala	Al ingreso	A los 6 meses
Índice de Katz	F	B
Escala Pfeiffer	2	5
Escala de Yesavage (escala abreviada)	7	4

Según los datos del supuesto responda a las siguientes cuestiones:

BLOQUE VALORACIÓN GERIATRICA.

Ejercicio 1: (1 punto)

1.1.-Completa: (0,3 puntos)

Escala	Utilidad de las escalas
Escala OARS	
Cuestionario de Baber	
Escala Lawton y Brody	

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE n° 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería



1.2.-¿Qué indicaría la obtención de 1 punto en la Escala de Lawton y Brody? (0,1 puntos)

1.3.- Valoración al ingreso. (0,3 puntos)

Escala	Utilidad de las Escala	¿Qué indica el resultado?
Índice de Katz		
Escala Pfeiffer		
Escala de Yesavage		

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE n° 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería



1.4.- Valoración a los 6 meses. (0,3 Puntos)

Escala	Resultado	Modificaciones en su situación desde que ingreso
Índice de Katz		
Escala Pfeiffer		
Escala de Yesavage		

Ejercicio 2: Enumera los ítems de la Escala de Barthel. (1 punto)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE nº 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería



SUPUESTO PRACTICO 2

El Sr. Moruno es usuario de un Centro Sociosanitario.

En el momento actual se encuentra encamado en una habitación individual por padecer una enfermedad infecciosa de transmisión entérica y diarrea.

Presenta un eritema cutáneo a nivel del omóplato, que no desaparece al cambiarlo de posición. En la región sacra se visualiza una escara que se extiende hasta el tejido subcutáneo, con presencia de exudado y esfacelos.

El talón está enrojecido con una vesícula de gran tamaño.

Es portador de sonda vesical permanente, debido a una hipertrofia benigna de próstata.

BLOQUE CADENA EPIDEMIOLÓGICA. BARRERAS HIGIÉNICAS.

Ejercicio 3: Indique marcando con un aspa (X), si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados: (1 punto)

Enunciado	V	F
Los eslabones de la cadena epidemiológica son el agente causal, la fuente de infección y el huésped susceptible.		
La fuente de infección y el reservorio pueden ser coincidentes.		
El reservorio sólo puede ser un "ente" inanimado.		
El ser humano actúa como fuente de infección, como persona enferma o como portador.		
El portador sano es aquella persona que no habiendo pasado la enfermedad elimina microorganismos.		
A través de alimentos contaminados se puede producir la transmisión directa de la enfermedad.		
Los insectos actúan como mecanismos de transmisión indirectos.		
Los fómites son objetos de uso personal del enfermo que pueden estar contaminados por el agente causal.		
La desinfección del material actúa sobre los mecanismos de transmisión.		
La susceptibilidad del huésped no varía de unos individuos a otros.		

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE n° 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería



Ejercicio 4: (1 punto)

4.1.- ¿En qué tipo de aislamiento el enfermo **NO** es la fuente de infección? (0,25 puntos)

- a) Aislamiento de barrera.
- b) Aislamiento protector.
- c) Aislamiento de contacto.
- d) Aislamiento común.

4.2.- En el caso del Sr. Moruno, ¿cuál de las medidas protectoras de barrera se adoptarían en el contacto con el paciente para el control de la infección entérica que padece? (0,25 puntos)

- a) Lavado de manos antes y después, bata y guantes.
- b) Lavado de manos antes, bata y guantes.
- c) Lavado de manos antes y después, mascarilla y guantes.
- d) Lavado de manos antes y después, mascarilla, bata y guantes.

4.3.- Señale el orden de **colocación** correcto de las siguientes medidas de protección. (0,25 puntos)

- a) Lavado de manos habitual, calzas, gorro, bata, mascarilla y guantes.
- b) Lavado de manos habitual, calzas, gorro, mascarilla, bata, y guantes.
- c) Lavado de manos habitual, gorro, calzas, mascarilla, bata, y guantes.
- d) Lavado de manos habitual, guantes, gorro, calzas, mascarilla, bata.

4.4.- Indica, ¿cuál es el uso correcto en los métodos de protección de barrera? (0,25 puntos)

- a) Los guantes limpios desechables se utilizarán en técnicas asépticas.
- b) El uso de guantes sustituye al lavado de manos.
- c) Al ponernos la bata esta debe cogerse por su parte interna.
- d) Al retirar la bata se evitará tocar la parte externa de la misma, siempre con los guantes puestos.

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE nº 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería



Ejercicio 7: El instrumental contaminado debe someterse a un proceso de desinfección/esterilización. Complete la siguiente tabla indicando si el método es de desinfección o de esterilización, siendo un método físico o químico en su caso, solo una de las opciones es correcta. (1 punto)

MÉTODO	ESTERILIZACIÓN		DESINFECCIÓN	
	FÍSICA	QUÍMICA	FÍSICA	QUÍMICA
Ebullición				
Estufa de Poupinel				
Óxido de etileno				
Compuestos clorados				
Ultrasonidos				
Clorhexidina				
Autoclave				
Povidona yodada.				

BLOQUE ÚLCERAS POR PRESIÓN.

Ejercicio 8: (1 punto)

8.1.- Enumera los ítems de la escala de Norton: (0,5 puntos)

8.2.- La puntuación obtenida en la escala de Norton es de 11. ¿Qué indicaría? (0,2 puntos)

8.3.- Según los datos del supuesto, completa la tabla: (0,3 puntos)

LESIÓN	ESTADÍO
Omóplato	
Reglón Sacra	
Talón	

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE nº 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería



BLOQUE DE INCONTINENCIA URINARIA.

Ejercicio 9.- Completa los siguientes apartados de cada ilustración, (en las imágenes 2 y 3 solo deberá responder a las cuestiones a y b). (1 punto)

- a) Indique el nombre de las siguientes sondas.
- b) Nombra al menos una utilidad (en caso de haber varias) de la misma.
- c) Indica para que sirve cada una de las vías de las imágenes 1 y 4.



Imagen 1




Imagen 2

- a) _____
- b) _____
- c) _____

- a) _____
- b) _____



Imagen 3




Imagen 4

- a) _____
- b) _____

- a) _____
- b) _____
- c) _____

Tribunal 2

Encargado de valorar el proceso selectivo para los turnos libre y discapacidad, convocado por Orden de 27 de diciembre de 2013, (DOE nº 249, de 30 de diciembre), referido a la categoría profesional de Auxillar de Enfermería



Ejercicio 10.- Completa la siguiente tabla: (1 punto)

Definición de Incontinencia	Tipo de Incontinencia
Pérdida involuntaria de orina que se produce al aumentar la presión en la cavidad intraabdominal.	
Pérdida involuntaria de orina que se produce en forma de goteo, asociada a un vaciado incompleto de la vejiga.	
Pérdida involuntaria de orina que se produce por la necesidad perentoria de orinar.	
Pérdida involuntaria de orina que se produce por la incapacidad del individuo para ir al retrete	